

داروهای "SOLUNA"

موسسه آموزشی تحقیقاتی طبوبی سلامت ایرانیان



ترجمه:

گروه مترجمین موسسه آموزشی تحقیقاتی طبوبی سلامت ایرانیان

سال ۱۴۰۰-۰۱



مرکز سیستم های پزشکی هوشمند

"IMEDIS"


LABORATORIUM
SOLUNA
HEILMITTEL GMBH



داروهای "SOLUNA"

"IMEDIS"

۲۰۰۴



داروهای "SOLUNA"

مرکز پژوهش های بیورزونانس طبوبی

ترجمه : علی کاشی پزا

پاییز ۱۴۰۰

© مرکز سیستم های پزشکی هوشمند "۲۰۰۴" ، "IMEDIS"



فهرست مطالب

۴ معرفی
۴ لیست داروها
۵ ۱. ترکیب بیماری‌های پرولیفراتیو (Alcangrol)
۵ ۲. متابولیسم و تغذیه (Aquavit)
۶ ۳. تقویت سیستم ایمنی (Azinat)
۷ ۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (Cerebretik)
۷ ۵. سیستم قلبی عروقی (Cordiak)
۸ ۶. اختلالات هموستاز (Dyscrasin N)
۹ ۷. عفونت‌های حاد (Epidemik)
۹ ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatic)
۱۰ ۹. لنف (Lymphatik N)
۱۱ ۱۰. هماهنگ سازی عملکرد هورمونی در زنان (Matrigen I)
۱۱ ۱۱. خونریزی رحمی (Matrigen II)
۱۲ ۱۲. بیماری‌های ارگان بینایی (Ophthalmik)
۱۲ ۱۴. مغز (Polypathik N)
۱۳ ۱۵. بیماری‌های سیستم تنفسی (Pulmonik N)
۱۴ ۱۶. بیماری‌های دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin)
۱۵ ۱۷. تقویت عمومی (Sanguisol)
۱۵ ۱۸. اختلالات متابولیک و سیستم ایمنی (Splenetik)
۱۶ ۱۹. بیماری‌های معده (Stomachik I)
۱۷ ۲۰. بیماری‌های دستگاه گوارش (stomakik II N)
۱۷ ۲۱. خونریزی (Styptik N)
۱۸ ۲۲. کم کاری تیروئید (Strumatik I)
۱۹ ۲۳. پرکاری تیروئید (Strumatik II)
۲۰ ۲۴. معده و اثنی عشر (Ulcussan A)
۲۰ ۲۵. بیماری‌های پوستی (Azinat Ointment N)
۲۱ ۲۶. فرآیندهای تخریبی (Alcangrol Ointment)
۲۱ ۲۸. بیماری‌های عصبی (Azinat Oil I)
۲۲ ۲۹. بیماری‌های التهابی (Azinat Oil II)



معرفی

داروهای شرکت "SOLUNA" (آلمان). داروهای اسپاژیریک spagyric هستند که مطابق با ترکیب و فرآیندی که ریشه در منابع سنتی پاراسلسوس دارد تهیه می شوند.

ترکیبات و توضیحات استفاده از سولونا

لیست داروها:

۱. بیماریهای پرولیفراتیو (Alcangrol) ؛
۲. متابولیسم و تغذیه (Aquavit) ؛
۳. تقویت سیستم ایمنی (Azinat)؛
۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (Cerebretik) ؛
۵. سیستم قلبی عروقی (Cordiak) ؛
۶. اختلالات هموستاز (Dyscrasin N)؛
۷. عفونت های حاد (Epidemik) ؛
۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatik) ؛
۹. لنف (Lymphatik N) ؛
۱۰. هماهنگ سازی عملکرد هورمونی در زنان (Matrigen I)
۱۱. خونریزی رحمی (Matrigen II) ؛
۱۲. بیماریهای اندام بینایی (Ophthalmik).
۱۴. مغز (Polypathik N) ؛
۱۵. بیماریهای سیستم تنفسی (Pulmonik N)؛
۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin) ؛
۱۷. تقویت عمومی (Sanguisol) ؛
۱۸. اختلالات متابولیک و سیستم ایمنی (Splenetik)؛
۱۹. بیماریهای معده (Stomachik I)؛
۲۰. بیماریهای دستگاه گوارش (Stomachik II N)؛
۲۱. خونریزی (Styptik N) ؛
۲۲. کم کاری تیروئید (Strumatik 1)؛
۲۳. پرکاری تیروئید (Strumatik II) ؛
۲۴. معده و اثنی عشر (Ulcusan A) ؛
۲۵. بیماریهای پوست (Azinat Ointment N)؛
۲۶. فرآیندهای تخریبی (Alcangrol Ointment) ؛
۲۸. بیماریهای عصبی (Azinat Oil I)؛
۲۹. بیماریهای التهابی (Azinat Oil II).



۱. ترکیب بیماری‌های پرولیفراتیو (Alcangrol)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر حاوی یک محلول آبی-الکلی از

calendulae flos (1:100), clematidis vitalbae herba (0,3:100), hamamelidis folium (1,0:100), laricifomes officinalis (0,3:100), viscid herba (1,0:100) y conium spag. D4 12,00

موارد مصرف: فرآیندهای پرولیفراتیو مزمن، تشکیل خوش خیم غدد و بافت‌ها (گواتر، فیبروز کیستیک، تومورهای القایی غدد لنفاوی، فیبروز، زخم‌های مزمن)، دیابت، هیپاتیت مزمن، کیست.

موارد منع مصرف: در صورت بیماری کبدی، بارداری و شیردهی و همچنین الکلیسم، این دارو نباید مصرف شود.

میزان مصرف داروی اصلی: بزرگسالان ۱۰-۲۰ قطره ۲ بار در روز، حل شده در یک لیوان آب، قبل از غذا.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll، وگا رزنانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می‌شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

همراه با داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatik) برای بیماریهای متابولیک مانند دیابت استفاده کنید.

برای سرطان می‌توان با داروی ۱۸ مصرف کرد. اختلالات متابولیک و سیستم ایمنی (Splenetik).

۲. متابولیسم و تغذیه (Aquavit)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر حاوی

angelicae radix (1: 100), anisi fructus (0.2: 100), cinchona cortex (0.1: 100), cola (0.2: 100), cubebae fructus (0.2 : 100), origani herba (0.1: 100), galangae rhizoma (0.5: 100), Zingiber officinale (0.2: 100), hiperici herba (0.1: 100), sorandri fructus (0.1 : 100), carvi fructus (0.2: 100), lavandula siccata (0.5: 100), marjoranae herba (0.5: 100), imperatoriae rhizoma (1: 100), melissae folium (1.5: 100), myristicae semen (0.2: 100), rosemarinus officinalis (1: 100), salviae officinalis folium (1: 100), piperis nigri fructus (0.1: 100), centaurii herba (0.4: 100), juniperi fructus (0.5: 100), piperis albi fructus (0.1: 100), hyssopi herba (0.2: 100), cinnamomi cortex (0.2: 100) and aurum chloratum D2 0.01 g.

موارد مصرف: اختلالات اشتها و فرآیندهای گوارشی، تسریع دوران نقاهت در بیماریهای طولانی مدت، دیابت، سندرم خستگی مزمن، اختلالات گوارشی مرتبط با آتونی روده.

موارد منع مصرف: در صورت بیماری کبدی، بارداری و شیردهی، و همچنین الکلیسم یا افرادی که به کینین حساس هستند، این دارو نباید مصرف شود.

میزان مصرف داروی اصلی: بزرگسالان ۵-۱۰ قطره در مقدار کمی شکر ۲-۴ بار در روز.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll، وگا رزنانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می‌شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده



برای بیماریهای متابولیک ، مانند دیابت ، از ترکیب داروی شماره ۱ بیماریهای پرولیفراتیو (Alcangrol) و داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatik) استفاده می شود.

برای سرطان ، ترکیبی با داروی شماره ۱۸ اختلالات متابولیک و سیستم ایمنی (Splenetik) و داروی شماره ۱. بیماریهای پرولیفراتیو (Alcangrol) استفاده می شود.

۳. تقویت سیستم ایمنی (Azinat)

ترکیبات : ۱۰۰ میلی لیتر حاوی

ferri oxidum saccharatum liquidum 2.5 g; silica colloidalis anhydrica 0.2 g; tartarus stibiatus D3 aquos. 10.0 g; spagyric distillate of antimony stibium sulfuratum nigrum in alcohol 96% 12.5 g; stibium sulfuratum nigrum and natirum nitricum in purified water, purified water 69.8 g.

موارد مصرف: بیماریهای حاد ویروسی یا باکتریایی با تب ، روماتیسم (از جمله مواردی که با تب همراه هستند) ، استعداد ابتلا به بیماریهای عفونی ، آرتروز ، بیماریهای التهابی ، فیبروز ، نقص ایمنی.

موارد منع مصرف: در صورت بیماری کبدی ، بارداری و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین ، این دارو نباید مصرف شود.

دوز داروی اصلی

بزرگسالان: در مرحله اولیه عفونت های تب زای حاد ، ۱۰ قطره هر ۲ ساعت ؛

در شرایط دیگر ، ۱۰-۲۰ قطره ۲-۳ بار در روز همراه با مقدار آب زیاد بنوشید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

دارو ۳. ایمنی (Azinat) - یک داروی اساسی با طیف گسترده اثر ، دارای اثرات ایمنی ، ضد التهابی و ترشحات است. می توان آن را در ترکیب با داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatic) ، داروی شماره ۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin) و داروی شماره ۹. (Lymphatik N) لنف برای درمان پاکسازی استفاده کرد.

۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (Cerebretik)

ترکیبات : ۱۰۰ گرم حاوی

argentum citricum 0.01 g; argentum colloidalis 0.009 g; nicotiana tabacum spag. D4 10.0 g;



alcohol 96% 10.0 g; purified water 79.981 g

موارد مصرف: از اثر آرام بخش دارو بر سیستم عصبی مرکزی و همچنین در دوران یائسگی استفاده می شود. در هر شرایط ناشی از افزایش فشار بر اعصاب سمپاتیک ، تشنج مربوط به سیستم عصبی مرکزی یا خودمختار ، اختلالات خواب ، اضطراب ، سردرد ، آنژین صدری ، دیسمنوره ، دردهای اسپاستیک ، قولنج در نوزادان سه ماهه ، اسپاسم همراه با تب ، صرع ، فشار خون بالا ، آسم ، دردهای معده اسپاستیک

موارد منع مصرف: در صورت بیماری کبدی ، بارداری و شیردهی ، و همچنین الکلیسم یا افرادی که به کینین حساس هستند ، این دارو نباید مصرف شود.

دوز داروی اصلی: بزرگسالان-۴-۸ قطره ۳-۴ بار در روز ، برای اختلالات خواب ۸-۱۰ قطره در شبها با مقدار زیاد آب بنوشید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

همراه با داروی شماره ۱۰. هماهنگ سازی عملکرد هورمونی در زنان (*Matrigen I*) ، این دارو دارای اثرات ضد اسپاسم است. دارای اثر آرام بخش در سندرم پیش از قاعدگی و دیسمنوره ، در صورت عدم انسداد آناتومیکی . این ترکیب می تواند برای مدت طولانی توسط زنانی که قصد باردار شدن دارند، استفاده شود.

همراه با داروی شماره ۱۱. خونریزی رحمی (*Matrigen II*) ، داروی شماره ۴. افزایش توان سمپاتیک (*Cerebretik*) ، برای کاهش درد در دوران یائسگی قابل استفاده است. در ترکیب با داروی شماره ۵. سیستم قلبی عروقی (*Cordiak*) ، داروی شماره ۴. افزایش توان سمپاتیک (*Cerebretik*) ، با آنژین صدری و آریتمی.

ترکیب زیر نیز موثر است: ۱۰ قطره داروی شماره ۵. سیستم قلبی عروقی (*Cordiak*) صبح و بعد از ظهر و ۱۰ قطره داروی شماره ۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (*Cerebretik*) در عصر.

۵. سیستم قلبی عروقی (*Cordiak*)

ترکیبات : ۱۰۰ میلی لیتر حاوی عصاره آبی-الکلی

crataegi folium cum flore (1: 1000), crataegi fructus (0.5: 100), hyperici herba (0.3: 100), leonuri cardiacaе herba (0.5: 100), melissae folium (0.5: 100), rosae flos (0.3: 100), rosmarinus officinalis (0.3: 100), sanguisorbae herba (0.5: 100) and aurum chloratum D2 (0.06: 100).
Extract: water-alcohol distillate of the above components 68.24 g; alcohol 96% 31.7 g.

موارد مصرف: نارسایی نهفته قلب ، مشکلات قلبی در سالخوردگان ، کاردیالژی ، افسردگی غیر ارادی و نهفته ، اختلالات خواب ناشی از نارسایی قلبی ، اختلال در گردش خون ، کاردیونوروز ، سندرم روهملد.

موارد منع مصرف: در صورت بیماری کبدی ، بارداری و شیردهی ، و همچنین الکلیسم یا افرادی که به کینین حساس هستند ، این دارو نباید مصرف شود.



میزان مصرف داروی اصلی: بزرگسالان ۸-۱۰ قطره ۲-۳ بار در روز با مقدار زیادی آب قبل از غذا بنوشید .

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

در ترکیب با داروی شماره ۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (*Renalin*) یا ادم قلبی. در ترکیب با داروی شماره ۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (*Cerebretik*) برای آنژین و بیماریهای مرتبط با اعصاب ، که می تواند منجر به مشکلات قلبی شود.

۶. اختلالات هموستاز (*Dyscrasin N*)

ترکیبات : ۱۰۰ گرم محلول حاوی

antimony stibium sulfuratum nigrum in alcohol 96% 69.4 g; stibium jodatum D4 30.0 g; terebinthinae sulfuratum aeth. 0.27 g; terebinthinae aeth. 0.15 g; thujae aeth. 0.05 g; cedri ligni aeth. 0.03 g; cajeputi aeth. 0.1 g.

موارد مصرف: سل لنفادنیت سرویکال ، اختلالات متابولیک ، دیسکریزیشن ، آگزامی مزمن ، پسوریازیس ، تجمع سموم ، آکنه ، نورودرماتیت ، سبوره ، زگیل.

موارد منع مصرف: در صورت بیماری کبدی ، بارداری و شیردهی ، و همچنین الکلیسم یا افرادی که به کینین حساس هستند ، این دارو نباید مصرف شود.

اثرات جانبی: در گواتر اتو ایمنی ، ید ، بسته به مقدار جذب شده ، می تواند باعث هیپرتریوز شود.

دوز داروی اصلی: بزرگسالان ۵-۱۰ قطره. ۳ بار در روز بر روی یک حبه قند.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

داروی شماره ۶. اختلالات هموستاز (*Dyscrasin N*) یک داروی متابولیک وسیع الطیف برای درمان بیماریهای مزمن نامتعارف است. در این مورد ، با داروی شماره ۹. لنف (*Lymphatik N*) ، ترکیب می شود. هر دو دارو باید به طور متناوب به مدت ۴-۶ هفته برای پاکسازی سیستم متابولیک و به ویژه مزانکیم-به اصطلاح "فضای پیشینگر" مصرف شوند.

در طول درمان سم زدایی ، توصیه می شود ۱۵ قطره از داروی شماره ۱۶ بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (*Renalin*) را در صبح و نیز ۱۵ قطره از داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (*Hepatik*) در عصر مصرف کنید. بیماران باید ۲ تا ۳ لیتر آب در روز بنوشند و مقدار کافی آنتی اکسیدان مصرف کنند.

ترکیبی از داروی شماره ۶. اختلالات هموستاز (*Dyscrasin N*) و داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (*Hepatik*) برای پسوریازیس استفاده می شود.



۷. عفونت های حاد (Epidemik)

ترکیبات: ۱۰۰ گرم محلول حاوی

0.1 g silica colloidalis anhydrica; tartarus stibiatus D3 10.0 g; spagyric distillate of antimony stibium sulfuratum nigrum in alcohol 96% 12.5 g; spagyric distillate of antimony stibium sulfuratum nigrum and natrium nitricum in purified water 5.0 g; purified water 72.4 g.

موارد مصرف: عفونت های حاد ، بیماری های التهابی ، تب ، روماتیسم مفصلی ، آنفولانزا ، پلوریت ، ذات الریه.

موارد منع مصرف: در صورت بیماری کبدی ، بارداری و شیردهی ، و همچنین الکلیسم یا افرادی که به کینین حساس هستند ، این دارو نباید مصرف شود.

میزان مصرف داروی اصلی: بزرگسالان ۱۰-۱۵ قطره ۲-۵ بار در روز با مقدار زیادی آب بنوشید (یعنی به آرامی در یک لیوان آب بنوشید).

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

در موارد دمای بالای بدن و تشنج ناشی از تب ، مصرف اضافی ۴-۶ قطره از داروی شماره ۴ . افزایش توان سمپاتیک (Cerebretik)

چندین بار در روز. در پایان مرحله اول تب ، می توانید داروی شماره ۷ عفونت های حاد (Epidemik) را با داروی شماره ۳. تقویت سیستم ایمنی (Azinat) جایگزین کنید. . همچنین می توانید مصرف هر دو دارو را به صورت متناوب ادامه دهید.

داروی شماره ۹. لنف (Lymphatik N) با داروی شماره ۷. عفونت های حاد (Epidemik) و داروی شماره ۳. ایمنی (Azinat) ، به ویژه با دیابتز لنفاوی یا آسیب به اندام های لنفاوی در طول بیماری ، عملکرد خوبی دارد.

۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatik)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر محلول اضافه عصاره آبی-الکی از

arvensis herba (0.5: 100), aloe capensis (0.5: 100), quassia amara (0.5: 100), hepaticae herba (0.5: 100), taraxaci herba cum radice (2: 100), carduus mariana (1: 100), agrimoniae herba (0.3: 100), chelidonii herba (1: 100), chelidonii radix (0.8: 100), chichorii radix (0.8: 100), zincum aceticum 0, 01 g; extract of water-alcohol distillate of the above components 58.49 g; alcohol 96% 41.5 g.

موارد مصرف: بیماریهای کبد و کیسه صفرا: هپاتیت مزمن ، چربی کبد دژنراتیو ، سیروز کبدی ، سنگهای کیسه صفرا ، اختلال در عملکرد ترشحات کبد ، اختلالات خواب با علت کبدی. انباشت سموم مزمن یا حاد در اثر آلودگی یا آلودگی محیط ، سرطان ، افسردگی ، دیابت ، چربی خون ، چاقی ، بواسیر ، بیماری های مزمن پوستی ، قارچ ، اثرات سمی فلزات سنگین استفاده می کند.

موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی ، حاملگی و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین ، این دارو نباید مصرف شود.



مقدار داروی اصلی: برای بزرگسالان ۱۰-۱۵ قطره ۱-۲ بار در روز همراه با نوشیدن مقدار زیادی آب (یعنی با یک لیوان آب).
 بهتر است دارو را عصر بخورید ، زیرا فعالیت کبد در شب اتفاق می افتد (با توجه به ساعات چینی فعالیت اندام).
 دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

داروی شماره ۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin) ، داروی شماره ۹. لنف (Lymphatik N) و داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatik) اساس درمان سم زدایی را تشکیل می دهند. همراه با آنها ، دوزهای کافی آنتی اکسیدان ها و همچنین مصرف زیاد آب بنوشید.

۹. لنف (Lymphatik N)

ترکیبات :

۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی

aqueous-alcoholic extract of guajaci lignum (0.7: 100), santali lignum rubrum (0.7: 100), sarsaparillae radix (0.3: 100), thujae occidentalis herba (0.15: 100), juglandis folium (0.3: 100); Extract: water-alcohol distillate of the above components 42.0 g; alcohol 96% 58.0 g.

موارد مصرف: اختلالات سیستم لنفاوی: لوزه های حاد و مزمن ، لنفاوی ، آپاندیسیت مزمن ، لنفادنیت مزمن ، لنفادنیت ، اختلالات متابولیک ، آلرژی ، سرطان ، رگ های واریسی ، چاقی ، بیماریهای مزمن پوستی ، قارچ ، اثرات سمی فلزات سنگین.
 موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی ، حاملگی و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین ، این دارو نباید مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: برای بزرگسالان ۱۰-۱۵ قطره ۲-۳ بار در روز همراه با نوشیدن فراوان آب (یعنی یک لیوان آب بنوشید).
 دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

هنگامی که به طور متناوب با داروی شماره ۶ . اختلالات هموستاز (Dyscrasin N) مصرف شود. این دارو در اگزما ، درماتوز مزمن و اختلالات متابولیک در بافت همبند بسیار موثر است. در ترکیب با داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatik) و داروی شماره ۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin) داروی شماره ۹. لنف (Lymphatik N) برای سم زدایی مناسب است.

۱۰. هماهنگ سازی عملکرد هورمونی در زنان (Matrigen I)

ترکیبات : ۱۰۰ میلی لیتر محلول نتیجه عصاره آبی-الکی

alchemilla vulgaris ex herba siccata (0.5: 100), matricaria flos (0.7: 100), equiseti herba (1.2: 100), lamii albi herba (1.0: 100) , calcium aceticum 0.27 g. Extract: Water-alcohol distillate of the above components 68.03 g; alcohol 96% 31.7 g.

موارد مصرف: اختلال در عملکرد سیستم هورمونی زنان ، نارسایی تخمدان ، آمنوره اولیه و ثانویه ، الیگومنوره ، دیسمنوره،



سندرم پیش از قاعدگی ، ناباروری ، تاخیر در رشد ، پوکی استخوان.

موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی ، حاملگی و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین ، این دارو نباید مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: بزرگسالان ۱۰ قطره ، ۲ بار در روز قبل از غذا با مقدار زیادی آب بنوشید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

در صورت دیسمنوره ، همراه با اسپاسم ، ترکیبی از داروی شماره ۴. افزایش توان سمپاتیک (*Cerebretik*) استفاده می شود. هر دو دارو می توانند به درمان ناباروری کمک کنند ، اگر به دلایل آناتومیکی نباشد. علاوه بر این ، می توانید از دوزهای کمتر (۸ قطره در روز) داروی شماره ۱۶ . بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (*Renalin*) استفاده کنید.

۱۱. خونریزی رحمی (*Matrigen II*)

ترکیبات :

۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی عصاره آبی-الکلی

alchemilla vulgaris ex herba siccata (0.5: 100), *bursae pastoris herba (0.5: 100)*, *lamii albi herba (0.3: 100)*, *millefolli herba (0.3: 100)*, *quercus cortex (1.0: 100)*, *calcium aceticum 0.15*. Extract: water-alcohol distillate of the above components 68.15 g; alcohol 96% 31.7 g.

موارد مصرف: متروراژی ، دیسمنوره ، میوماتوز ، خونریزی ، اندومتریوز ، پوکی استخوان.

موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی ، حاملگی و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین ، این دارو نباید مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: بزرگسالان ۱۰ قطره ۳ بار در روز قبل از غذا با آب فراوان بنوشید .

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

در صورت خونریزی شدید ، از ترکیب داروی شماره ۲۱ خونریزی (*Styptik N*). استفاده می شود. داروی شماره ۱۱. خونریزی رحمی (*Matrigen II*) را می توان با داروی شماره ۱۹ . بیماریهای معده (*Stomachik I*) در کولیت مزمن ، همراه با اسهال و وجود خون در مدفوع ترکیب کرد.

۱۲. بیماریهای ارگان بینایی (*Ophthalmik*)

ترکیبات : ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی عصاره آبی الکلی

euphrasiae herba (1: 100), *hyperici herba (1: 100)* *rosae flos, (0.2: 100)*, *rosmarinus officinalis (0.2: 100)*, *verbena herba (0.3 : 100)*, *foeniculi amari fructus spag. basic tincture 19.0 g* *aurum chloratum D2 0.12 g*. Extract: water-alcohol distillate of the



above components 55.2 g; alcohol 95% 25.68 g.

موارد مصرف: مشکلات بینایی، بیماریهای چشمی، ملتحمه، کاهش بینایی، آب مروارید.

موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی، حاملگی و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین، این دارو نباید مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: بزرگسالان ۵-۱۰ قطره ۲ بار در روز قبل از غذا همراه با آب فراوان نوشیده شود.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

برای بیماریهای دژنراتیو چشم، از ترکیب داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatik) استفاده می شود. برای بیماریهای التهابی چشم و گلوکوم، ترکیبی از داروی شماره ۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin) و داروی شماره ۹. لنف (Lymphatik N) استفاده می شود.

۱۴. مغز (Polypathik N)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی عصاره آب الکلی

artemisiae herba (0.4: 100), paeoniae flos (0.6: 100), viscid herba (2: 100), helleborus spag. D4 40.0 g; ammonium bromatum 0.12 g; kalium bromatum 0.12 g; natrii bromidum 0.12 g. Extract: aqueous-alcoholic distillate of the above components 14.14 g; alcohol 96% 45.5 g.

موارد مصرف: اسپاسم های مرتبط با سیستم عصبی مرکزی، اختلال عملکرد دستگاه ادراری، صرع، اکلامپسی، ادم،

افتادگی، فشار خون بالا با احتقان در عروق سر، آپوپلکسی با ادم مغزی واکنشی

پلکسیا، تحریک سیستم عصبی مرکزی، ادم مغزی، میگرن، فشار خون بالا، استرس روحی و روانی،

موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی، حاملگی و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین، این دارو نباید مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: بزرگسالان - ۵-۱۰ قطره ۲ بار در روز با آب فراوان نوشیده شود.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

هنگامی که سیستم عصبی مرکزی به ویژه در صرع برانگیخته می شود، درمان با داروی شماره ۱۴. مغز (Polypathik N) و داروی شماره ۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (Cerebretik) ایده آل است. برای کاهش اسپاسم، ۲-۵ قطره از دارو شماره ۱۴. مغز (Polypathik N) در روز، ۴-۸ قطره دارو شماره ۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (Cerebretik) در صبح و ۸ قطره در شب قبل از خواب استفاده کنید. این درمان را می توان برای مدت طولانی تجویز کرد. این ترکیب برای گرفتگی های ناشی از تب نیز موثر است، (استفاده کوتاه مدت). برای مشکلات انسدادی داروی شماره ۱۴. مغز (Polypathik N) را می توان همراه با داروی شماره ۱۶ بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin) استفاده کرد.

۱۵. بیماریهای سیستم تنفسی (Pulmonik N)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی عصاره آبی-الکلی

marrubi herba (0.5: 100), species pectorals (0.5: 100), althaea radix (1: 100), eucalypti folium (0.2: 100), polygalae amarae herba cuin radice (0.5: 100), pulmonariae herba (0.7: 100), salviae officinalis folium (0.7: 100), droserae herba (0.5: 100), violae tricoloris herba (0.5: 100) , verbasci flos. (0.2: 100), hyssopi herba (0.2: 100), silica colloidalis anhydrica 0.22g and tartarus stibiatus D2, aquos. 1.0g. Extract: water-alcohol distillates of the above components 57.98 g; Alcohol 96% 40.8 g.

موارد مصرف: بیماریهای التهابی و انسدادی تنفسی ، آنفولانزا ، برونشیت ، سیاه سرفه ، ذات الریه ، آمفیزم ، آسم برونشی ، حنجره ، نای.

موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی ، حاملگی و شیردهی و همچنین در صورت اعتیاد به الکل یا افرادی که به کینین حساس هستند ، دارو نباید مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: برای بزرگسالان ۵-۱۰ قطره ۲-۳ بار در روز با نوشیدن آب فراوان (بهتر است آن را با گیاه دم اسب دم کرده بنوشید) ، به آرامی بنوشید .

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

برای درمان موثر تمام بیماری های التهابی دستگاه تنفسی ، ترکیبی از داروی شماره ۳. تقویت سیستم ایمنی (Azinat) استفاده می شود. برای برونشیت مزمن ، برونکواسپاسم ، باید از داروی شماره ۱۵ . بیماریهای سیستم تنفسی (Pulmonik N) به مدت طولانی استفاده شود..

۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی

betulae folium (0.5: 100), bursae pastoris herba (1.0:100), equiseti herba (0.5: 100), graminis rhizoma (1.0: 100), ononidis herba (1.0: 100), ononidis radix (0.7: 100), petroselini fructus (1.0: 100), petroselini radix (1.0: 100), solidaginis virgaureae herba (1.3: 100), uvae ursi folium (1.0: 100), sarothamnus spag. basic tincture cum cuprum colloidal 10.0 g. Extract: Hydroalcoholic distillate of the above components 70.8 g; alcohol 96% 19.2g.

موارد مصرف: کلیه بیماریهای التهابی و دژنراتیو حوزه تناسلی ، سیستیت ، پیلونفریت ، گلومرولونفریت ، لیتیازیس ، بیماریهای مزمن اگزوداتیو پوست و مخاط ، فشار خون کلیوی ، آلرژی ، سرطان ، شب ادراری شبانه ، اختلالات باروری ، چاقی ، بیماریهای مزمن پوستی ، میکوز ، اثرات سمی فلزات سنگین.

موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی ، حاملگی و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین ،



این دارو نباید مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: برای بزرگسالان ۵-۱۰ قطره ۲-۳ بار در روز با نوشیدن آب فراوان (بهتر است آن را با گیاه دم اسب یا افسنتین دم کنید) ، آن را به آرامی بنوشید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

در موارد فشار خون بالا ، به ویژه فشار خون کلیوی ، تجویز همزمان با داروی شماره ۱۴ . مغز (Polypathik N) توصیه می شود.

در دیابت مزمن پوست ، به صورت ترکیب با داروی شماره ۶ . اختلالات هموستاز (Dyscrasin N) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای بیماریهای مزمن آگزوداتیو سیستم تنفسی (سینوس ها ، برونش ها) ، به صورت ترکیبی از داروهای شماره ۹ . لنف (Lymphatik N) و داروی شماره ۱۵ . بیماریهای سیستم تنفسی (Pulmonik N) استفاده می شود.

در صورت التهاب ، باید با داروی شماره ۳ . تقویت سیستم ایمنی (Azinat) ترکیب شود.

دوزهای پیشنهادی

در صبح: ۱ بار ، ۱۰ قطره داروی شماره ۱۶ . بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin)

در شب: ۱ بار ، ۱۰ قطره ، داروی شماره ۹ . لنف (Lymphatik N) (سینوس ها ، لوزه ها) یا داروی شماره ۶ اختلالات هموستاز (Dyscrasin N) یا داروی شماره ۱۵ . بیماریهای سیستم تنفسی (Pulmonik N)

صبح و عصر: ۱ بار ، ۱۰ قطره دارو شماره ۳ . تقویت سیستم ایمنی (Azinat) .



۱۷. تقویت عمومی (Sanguisol)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر محلول شامل عصاره آبی-الکلی

crataegi folium cum flore (1: 100), crataegi fructus (0.5: 100), hyperici herba (0.3: 100), leonuri cardiaca herba (0.5: 100), melissae folium (0.5: 100), rosae flos (0.3: 100), rosmarinus officinalis (0.3: 100), sanguisorbae herba 0.5: 100) 78.38 g; aurum chloratum D2 0.12 g; crocus D 0.5 g; alcohol 96% 21.0 g.

موارد مصرف: فرآیندهای حیاتی که نیاز به احیا دارند. خستگی جسمی، روحی و روانی، بیماریهای سل، ضعف گردش خون، سرطان، "سوزش" فرآیندهای خود ایمنی، وضعیت پس از درمان فشرده سرکوب کننده سیستم ایمنی، افسردگی، فلج در پس زمینه آپوپلکسی، دوره های توانبخشی بعد از عمل، افت فشار خون، بیماریهای مزمن طولانی مدت.

موارد منع مصرف: در موارد بیماریهای کبدی، حاملگی و شیردهی و همچنین در مورد الکلیسم یا افراد حساس به کینین، این دارو نباید مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: بزرگسالان ۲ بار در روز، ۵-۱۰ قطره با مقدار زیادی آب بنوشید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

در صورت نقص ایمنی، با داروی شماره ۳ تقویت سیستم ایمنی (Azinat) استفاده می شود. اگر خستگی ناشی از سمیت متابولیک است، توصیه می شود که با داروی شماره ۹ لنف (Lymphatik N) ترکیب شود.

دوزهای پیشنهادی

صبح و بعد از ظهر: ۲ بار ۵ قطره داروی شماره ۱۷. تقویت عمومی (Sanguisol)

در صبح: ۱ بار، ۱۰ قطره داروی شماره ۹. لنف (Lymphatik N).

بعد از ظهر: ۱ بار، ۱۰ قطره داروی شماره ۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار (Renalin).

در شب: ۱ بار، ۱۰ قطره داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatic).

دوز مصرفی برای سم زدایی شدید، علاوه بر این از آنتی اکسیدان ها نیز استفاده کنید. اگر ریتم سیستم خودمختار از بین برود، می توان با استفاده از ۱۰ قطره داروی شماره ۱۷. تقویت عمومی (Sanguisol) احیا را در صبح و ۱۰ قطره از داروی شماره ۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (Cerebretik) در عصر استفاده کرد.

۱۸. اختلالات متابولیک و سیستم ایمنی (Splenetik)

ترکیبات: ۱۰۰ گرم محلول حاوی

antimony stibium sulfuratum nigrum in alcohol 96% 15.0 g; kalium carbonicum 1.0 g; tartarus depuratus 0.4 g; tartarus stibiatus D3 aquos. 10.0 g; aqua purificata 73.6 g.

موارد مصرف: انواع سنگ ها؛ همه اشکال دژنراتیو فرآیندهای "تحریک کننده" در متابولیسم، سیستم عصبی و روان؛ نقص ایمنی ریشه های مختلف این دارو برای اختلالات عملکردی طحال، آدنومیا، سرطان، نقرس و انواع فرآیندهای دژنراتیو نشان داده شده است.



موارد منع مصرف: در صورت بیماری کبدی ، بارداری و شیردهی ، و همچنین الکلیسم یا افرادی که به کینین حساس هستند ، این دارو نباید مصرف شود.

میزان مصرف داروی اصلی: بزرگسالان ۱۰ قطره ۲-۳ بار در روز قبل از غذا با مقدار زیادی آب نوشیده شود .

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

این درمان با داروی شماره ۹ . لنف (*Lymphatik N*) ، داروی شماره ۱۶ . بیماریهای دستگاه تناسلی ومجاری ادرار (*Renalin*) . و داروی شماره ۸ . کبد و کیسه صفرا (*Hepatic*) ، که عوامل مهم سم زدایی هستند ، خوب عمل می کند. انگیزه برای خروج از بیماری ، که داروی شماره ۱۸ اختلالات متابولیک و سیستم ایمنی (*Splenetik*) است. در بیماریهای مزمن سخت ، با دو داروی تنظیم کننده ریتم تجویز می شود.

۱۹. بیماریهای معده (*Stomachik I*)

ترکیبات : ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی عصاره آبی-الکلی

angelica radix (0.5: 100), artemisia herba (0.5: 100), gentianae radix (0.5: 100), galangae rhizoma (0.3: 100), acorus calamus (0.5: 100), imperatoriae rhizoma (0.5: 100), melissa folium (0.5: 100), menthae piperitae folium (0.5: 100), aurantii pericarpium (1.0: 100), rosmarinus officinalis (0.5: 100), centaurii herba (0.3: 100), juniperi fructus (0.8: 100), absinthii herba (0.5: 100). Extract: water-alcohol distillate of the above components 42.0 g; alcohol 96% 58.0 g.

موارد مصرف: اختلالات گوارشی ، نفخ ، تهوع و درد در معده ، گاستریت مزمن با اسیدیته کم ، شکایت از معده "عصبی" ، سندرم معده (سندرم رومولد) ، یبوست ، اتونی معده.

موارد منع مصرف: در صورت مصرف دارو نباید مصرف شود

ضایعات کبد ، بارداری و شیردهی ، و همچنین با الکلیسم یا افراد حساس به کینین.

مقدار داروی اصلی: برای بزرگسالان ۵-۱۰ قطره ۳ بار در روز روی یک حبه قند همراه یا بعد از غذا.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

برای فعال کردن هضم و تحریک متابولیسم ، باید از آن به همراه داروی شماره ۸ . کبد و کیسه صفرا (*Hepatic*) استفاده کرد. و داروی شماره ۱ . بیماریهای پرولیفراتیو (*Alcangrol*) .

دوزهای پیشنهادی

داروی شماره ۱۹ . بیماریهای معده (*Stomachik I*) - یک بار در روز ، ۵-۱۰ قطره بعد از غذا.

داروی شماره ۸ . کبد و کیسه صفرا (*Hepatic*) ۱ بار ۱۵ قطره در شب.

داروی شماره ۱ . بیماریهای پرولیفراتیو (*Alcangrol*) ۱ بار ۱۵ قطره در صبح.



در گاستروانتریت مزمن ، می توانید به طور متناوب داروی شماره ۱۹. بیماریهای معده (*Stomachik I*) و داروی شماره ۲۰. بیماریهای دستگاه گوارش (*stomakik II N*) را مصرف کنید.

۲۰. بیماریهای دستگاه گوارش (*Stomachik II N*)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی عصاره آبی-الکلی

condurango (1: 100), calendula flos. (1: 100), bismutum-ammonium citricum D2 1.0 g; conium spag. D4 15.0 gi tartarus stibiatus D2 aquos. 1.0 g. Extract: water-alcohol distillate of the above components 37.5 g; alcohol 96% 45.5 g.

موارد مصرف: بیماریهای التهابی دستگاه گوارش ، زخم ، کولیت مخاطی و زخمی ، گاستریت حاد ، زخم معده ، اسهال ، استفراغ.

موارد منع مصرف: این دارو نباید برای بیماریهای کبدی ، بارداری و شیردهی ، و همچنین برای الکلیسم یا افراد حساس به کینین مصرف شود.

مقدار داروی اصلی: بزرگسالان ۵-۱۰ قطره ۲-۳ بار در روز با مقدار زیادی آب بنوشید (می توانید همراه با چای بابونه بنوشید).

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده ،

برای اسهال همراه با خونریزی ، انتروکولیت حاد ، کولیت اولسروز یا زخم معده و اثنی عشر ، ترکیبی با داروی شماره ۲۱. خونریزی (*Styptik N*) استفاده می شود. برای اختلالات التهابی مزمن گوارشی ، داروی شماره ۲۰. بیماریهای دستگاه گوارش (*stomakik II N*) ، که دارای اثر ضد التهابی است ، باید به طور متناوب با داروی شماره ۱۹. بیماریهای معده (*Stomachik I*) داده شود. که به تقویت عملکرد کمک می کند. معده در صورت اسپاسم شدید ، می توان داروی شماره ۴. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (*Cerebretik*). به عنوان مکمل را تجویز کرد .

۲۱. خونریزی (*Styptik N*)

ترکیبات: ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی عصاره آب الکلی

bursae pastoris herba (0.2: 100), hyperici herba (0.4: 100), millefolii herba (0.4: 100), plantaginis lanceolatae herba (0.3: 100), polygoni bistortae rhizoma (0.8: 100), quercus cortex (1.0: 100), ratanhia radix (1.0: 00), tormentillae rhizoma (1.2: 100), urticae fructus (0.3: 100), urticae herba (0.8: 100), (the final product lacks: ferrum metallicum 0.04 g) Extract: water-alcohol distillate of the above components 41.96 g; alcohol 96% 58.0 g.

موارد مصرف: هموستاتیک ، قابض ، همراه با خونریزی لثه و بواسیر ، اسهال خونی ، اپیستاجی ، خونریزی همراه زخم های دستگاه گوارش ، سیستیت هموراژیک ، متروراژی ، عواقب ضربه.

موارد منع مصرف: این دارو نباید برای بیماریهای کبدی ، بارداری و شیردهی ، و همچنین برای الکلیسم یا افرادی که به کینین



حساس هستند مصرف شود.

دوز داروی اصلی: بزرگسالان ۵-۱۰ قطره ۲-۳ بار در روز با آب فراوان نوشیده شود. در صورت خونریزی حاد - ۴-۵ بار در روز.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

در صورت مترواژی ، ترکیب با داروی شماره ۱۱ . خونریزی رحمی (*Matrigen II*) موثرتر است. در مورد کولیت اولسروز ، ترکیب ایده آل با داروی شماره ۲۰ . بیماریهای دستگاه گوارش (*stomakik II N*) است. و داروی شماره ۴. افزایش توان سمپاتیک (*Cerebretik*) داروی شماره ۲۱. خونریزی (*Styptik N*) یک داروی کوتاه مدت است و فقط زمانی باید مصرف شود که تمایل به خونریزی افزایش یابد.

۲۲. کم کاری تیروئید (*Strumatik I*)

ترکیبات : ۱۰۰ میلی لیتر محلول حاوی عصاره آبی-الکلی

scrophulariae radix (0.75: 100), *quercus cortex (1.5: 100)*, *lichen islandicus (1.0: 100)*, *equiseti herba (0.5: 100)*, *fucus (3.0.100)*. Extract: hydroalcoholic distillate of the above components 54.5; alcohol 96% 38.0 g of stibium jodatum D 37.5 g.

موارد مصرف: کم کاری تیروئید و اختلالات متابولیک همزمان ؛ اختلال عملکرد غده تیروئید

موارد منع مصرف: این دارو نباید برای بیماریهای کبدی ، بارداری و شیردهی ، و همچنین برای اعتیاد به الکل یا افراد حساس به ید مصرف شود.

اثرات جانبی: با بافت تیروئید خودگردان ، ید ، بسته به میزان جذب ، می تواند منجر به پرکاری تیروئید شود.

مقدار داروی اصلی: بزرگسالان ۵-۱۰ قطره ۲ بار در روز قبل از غذا با آب فراوان نوشیده شود.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

در صورت کم کاری تیروئید ، داروی شماره ۱۰ . هماهنگ سازی عملکرد هورمونی در زنان (*Matrigen I*) باید تجویز شود. در دوز یکسان ۲ بار در روز ، اما به مدت طولانی تر. اگر کمبود انرژی و انگیزه وجود دارد ، می توانید پذیرش را با داروی شماره ۱۷. تقویت عمومی (*Sanguisol*) ترکیب کنید. احیا (سانگوئیزول) ، که باید صبح مصرف شود. داروی شماره ۱. بیماریهای پرولیفراتیو (*Alcangrol*) مکمل ایده آل برای بزرگ شدن غده تیروئید است.



۲۳. پرکاری تیروئید (Strumatik II)

ترکیبات: ۱۰۰ گرم پودر حاوی

powder contains scrophulariae radix 7.5 g; carrageen 15.0 g; quercus cortex 15.0 g; lichen islandicus 7.5 g; luvos Heilerde No. 1 10.0 g; carbo spongiae 7.5 g; equiseti herba 7.5 g; stibium sulfuratum nigrum D4 15.0 g; fucus 15.0 g.

موارد مصرف: گواتر؛ اختلال عملکرد غده تیروئید

موارد منع مصرف: ندارد

مقدار داروی اصلی: بزرگسالان ۱ نوبت داروی خشک روی زبان ۲ بار در روز.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

فعالیت غده بستگی زیادی به چرخه ماه دارد. بنابراین، دوز دارو شماره ۲۲. کم کاری تیروئید (*Strumatik I*) و داروی شماره ۲۳. پرکاری تیروئید (*Strumatik II*) باید متناسب با آن تنظیم شود. موارد زیر موثر تر هستند.

توصیه ها:

۱. ماه اول: از پایان ماه کامل شروع کنید و تا ماه جدید دارو شماره ۲۲. کم کاری تیروئید (*Strumatik I*) مصرف کنید.
 ۲. به مدت ۱۴ روز استراحت کنید.
 ۳. ماه دوم: از پایان ماه کامل شروع کنید و تا ماه جدید بعدی دارو شماره ۲۳. پرکاری تیروئید (*Strumatik II*) را مصرف کنید.
 ۴. به مدت ۱۴ روز استراحت کنید.
 ۵. این کار را یکبار دیگر تکرار کنید.
- دوره دیگری وجود دارد: از پایان ماه کامل شروع کنید و تا ماه جدید دارو شماره ۲۲. کم کاری تیروئید (*Strumatik I*) مصرف کنید و دارو شماره ۲۳. پرکاری تیروئید (*Strumatik II*) همزمان، سپس از ماه جدید تا ماه کامل فقط داروی شماره ۲۲. کم کاری تیروئید (*Strumatik I*)



۲۴. معده و اثنی عشر (Ulcussan A)

ترکیبات :

100 g of beggar contains bismatum subnitricum 2.131 g; bismutum subsalicylicum 3,278 r. cola semen 0.839 r; condurango cortex 4.426 g; quercus cortex 9.951 g; magnesium subcarbonicum 5.529 g; carbo ligni 5.762 g; luvus Heilerde No. 1 7.159 g; visci herba 4.430 g; calendulae flos. 4.426 g; teucarii scor. herba 1,375 g; millefolii herba 4.426 g; stibium sulferatum nigrum 10.105 g; terra silicea purificata 13.540 g; juglandis folium 21.731 g; absinthii herba 0.763 g; saccharinnatrium 2 H2O 0.171 g.

همه اجزاء به صورت پودر خوب آسیاب می شوند.

موارد مصرف: زخم معده و اثنی عشر ، گاستروانتریت.

موارد منع مصرف: خیر.

مقدار داروی اصلی: برای بزرگسالان ۱ قاشق چایخوری را به طور کامل در یک لیوان آب خوب هم بزنید ، ۲-۳ بار در روز بنوشید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

برای بیماری زخم معده به طور متناوب با داروی شماره ۲۰ استفاده می شود. بیماریهای دستگاه گوارش (Stomachik II N). در بیماران مبتلا به زخم معده ، تحریک رویشی اغلب مشاهده می شود ، آنها به استرس حساس هستند. بنابراین ، استفاده همزمان از داروی ۴ مفید است. افزایش توان اعصاب سمپاتیک (Cerebretik) در صبح و عصر.

۲۵. بیماریهای پوستی (Azinat Ointment N)

ترکیبات : ۱۰۰ گرم پماد حاوی

100 g of ointment contain cajeput aeth. 0.2 g; faec. vin. aeth. 0.2 g; thujae aeth. 0.1 r; stibium jodatum D3 2.0 r; stibium sulfuratum nigrum 1.0 g; alcohol 60% 3.0 g; paraffinum 10.375 g; vaselinum 20.75 g; adeps lanae up to 100.0 g.

موارد مصرف: آگزما ، درماتیت ، فورونکولوز ، خلط ، فیستول.

موارد منع مصرف: خیر.

مقدار داروی اصلی: بسته به شدت علائم ، یکبار در روز یا ۳ بار در هفته استفاده شود. یک لایه ضخیم از پماد را روی ناحیه مشکل پوست بمالید ، بانداز کنید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود و روی کرم خنثی اعمال می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده



برای زخم های مزمن حاشیه‌دار و تومورهای تکثیر کننده ، جایگزین داروی شماره ۲۶. فرآیندهای تخریبی (*Alcangrol*)
Ointment شوید. فرآیندهای مخرب (پماد آلکانگرول). درمان جامع پوست شامل داروهای شماره ۹. لنف (*Lymphatik*)
N). داروی شماره ۶ اختلالات هموستاز (*Dyscrasin N*) . داروی شماره ۱۶. بیماریهای دستگاه تناسلی و مجاری ادرار
(Renalin) است. علاوه بر این می توانید از رایحه درمانی استفاده کنید.

۲۶. فرآیندهای مخرب (پماد *Alcangrol*)

ترکیبات: ۱۰۰ گرم پماد حاوی

ointment contain conii maculati herba fluid 2.0 g; gaultheriae aeth. 0.5 g; paraffmum
 10.835 g; vaselinum 21,665 g; adeps lanae up to 100.00 g.

موارد مصرف: تومورها و زخم های طبیعت مخرب.

موارد منع مصرف: خیر.

میزان مصرف محصول اصلی: بسته به شدت علائم ، یکبار در روز یا ۳ بار در هفته استفاده شود. لایه ضخیمی از پماد را روی
 ناحیه مشکل پوست بمالید ، باند پیچی کنید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود و روی کرم
 خنثی اعمال می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

برای ضایعات مزمن زخمی پوست ، از ترکیب داروی شماره ۲۵ . بیماریهای پوستی (*Azinat Ointment N*) استفاده کنید.

۲۸. بیماریهای عصبی (*Azinat Oil I*)

ترکیبات: ۱۰۰ گرم پماد حاوی

ointment contains cintronellae aeth. 2.5 g; lavendulae aeth. 0.3 g; origani aeth. 1.0 r; pini
 sibir. aeth. 2.0 r; rosmarini aeth. 77.5 r; rutae aeth. 1.0 g; verbenae aeth. 1.0 g; rosmarini
 aeth. 10.9 gv lini sulf. oleum 3.8 g.

موارد مصرف: دردهای عصبی: نورالژی سه قلو ، نورالژی اکسیپیتال ، نورالژی بین سیستمی و سیاتیک ، درد مفاصل ، سردرد
 ، گوش درد ، سینوزیت.

موارد منع مصرف: خیر.

میزان مصرف محصول اصلی: چند قطره را در نواحی دردناک بمالید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود و روی کرم
 خنثی اعمال می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

برای سردردهای احتقانی ، با داروی شماره ۴. افزایش توان سمپاتیک (*Cerebretik*) استفاده کنید. برای درد عصبی و تمایل
 به اسپاسم ، از داروی شماره ۱۴ . مغز (*Polypathik N*) استفاده کنید.



۲۹. بیماریهای التهابی (Azinat Oil II)

ترکیبات : ۱۰۰ گرم پماد حاوی

ointment will contain eucalypti aeth. 2.0 g; pini pum aeth. 0.5 g; pini sibir. aeth. 2.0 g; salvia aeth. 0.5 g; terebinth, aeth. 80.0 g; terebinth sulf. aeth. 15.0 g

موارد مصرف: بیماریهای تنفسی ، سینوزیت ، فرآیندهای روماتیسمی ، التهاب مفاصل.

موارد منع مصرف: خیر.

مقدار داروی اصلی: برای بیماریهای تنفسی ، چند قطره از دارو را ۱-۲ بار در روز به جناغ سینه بمالید. برای شرایط روماتیسمی ، ۱-۲ بار در روز به مناطق مشکل بمالید.

دوز آنالوگ الکترونیکی دارو: با استفاده از روش R. Voll ، وگا رزونانس تست (VRT) یا VRT + تعیین می شود و روی کرم خنثی اعمال می شود.

داروهای ترکیبی توصیه شده

برای بیماریهای تنفسی ، از داروی شماره ۳. تقویت سیستم ایمنی (Azinat) و داروی شماره ۱۵. بیماریهای سیستم تنفسی (Pulmonik N). برای بیماریهای روماتیسمی - داروی شماره ۸. کبد و کیسه صفرا (Hepatic) و داروی شماره ۱۸. اختلالات متابولیک و سیستم ایمنی (Splenetik) نیز استفاده می شود.